Screening Gestationsdiabetes

Früh-Screening <small>(bei RF) < 24.SSW</small>	Datum: SSW:	Nüchtern glukose: mmol/l (<5,1) HbA1c: % (<5,9)
50g GCT <small>SSW 24+0 – 27+6</small>	Datum: SSW:	Nüchtern glukose: mmol/l Glukose nach 1 h: mmol/l (<7,5)
75g oGTT	Datum: SSW:	nüchtern: mmol/l (<5,1) nach 60 min: mmol/l (<10) nach 120 min: mmol/l (<8,5)
☐ normale Nüchtern / Gelegenheitsglukose <small>(i.d. Frühschwangerschaft)</small> ☐ oGTT Normalbefund		☐ Gestationsdiabetes ☐ manifester Diabetes mellitus <small>(Diagnose in der Schwangerschaft)</small>
Datum	Ärztliches Erstgespräch, Ersts Schulung: Blutglukoseselbstkontrolle, Ernährungsberatung	
Datum	☐ ☐ ☐ ☐	Insulin ☐ nein ☐ ja
Datum	☐ ☐ ☐ ☐	Insulin ☐ nein ☐ ja
Datum	☐ ☐ ☐ ☐	Insulin ☐ nein ☐ ja
Datum	☐ ☐ ☐ ☐	Insulin ☐ nein ☐ ja
Datum	☐ ☐ ☐ ☐	Insulin ☐ nein ☐ ja
Datum	☐ ☐ ☐ ☐	Insulin ☐ nein ☐ ja
Datum	☐ ☐ ☐ ☐	Insulin ☐ nein ☐ ja
Datum	☐ ☐ ☐ ☐	Insulin ☐ nein ☐ ja
Datum	☐ ☐ ☐ ☐	Insulin ☐ nein ☐ ja
Datum	☐ ☐ ☐ ☐	Insulin ☐ nein ☐ ja

Name:

vET:

Ziel-BZ:

- vor dem Essen unter 5,3 mmol/l
- 1 Stunde nach dem Essen unter 7,8 mmol/l
- 2 Stunden nach dem Essen unter 6,7 mmol/l

6 bis 12 Wochen nach der Entbindung
Glukosebelastungstest erforderlich.

Diabetes-Schwerpunktpraxis

- Blutzuckerwerte im Zielbereich
- nur einzelne Blutzuckerwerte oberhalb des Zielbereichs
- Blutzuckerwerte überwiegend oberhalb des Zielbereichs
- Blutzuckerdokumentation erlaubt keine Beurteilung der Stoffwechsellaage